

農薬登録票

登録番号 第 21766 号 登録年月日 平成 27 年 9 月 6 日
登録の有効期間 平成 30 年 9 月 5 日

農薬の種類 グリホサートナリクナム塩液剤
農薬の名称 ナリクノアゾンワンホード
物理的・化学的性状 淡黄色透明水溶性液剤

有効成分の種類及び含有率 カリウム(有効成分)ナリクナト 48.0%
その他の成分の種類及び含有率 水、界面活性剤等 52.0%

製造者又は輸入者の名称及び住所 東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1
日産化学工業株式会社
取締役社長 木下 小次郎

製造場の名称及び所在地 山口県山崎小野田市大字小野田6903-1
日産化学工業株式会社小野田工場
埼玉県北埼玉郡上里町大字神保原町宇面台235-1

平成27年9月9日 農林水産大臣 林 芳
農薬取締法第6条の2第2項の規定に基づき
平成27年9月9日 付けをもって上記のとおり
登録の登録をしたので本票を普通交付する。




Table with columns: (別記) 作物名, 適用場所, 適用被薬名, 使用時期, 使用量, 希釈水量, 本剤の使用回数, 使用方法, ナリクナトを含む農薬の使用回数.

Table with columns: 登録農薬(登録号), 登録名(商品名), 登録名(学名), 登録名(別名), 登録名(その他), 登録名(その他), 登録名(その他).

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用法	1アールを含む農家の総使用回数
				葉量	希釈水量			
そば		一年生及び多年生雑草	排草前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	50~100	2回以内	2回以内	3回以内
			とうもろこし出芽前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
五類 (雑草 ただし、だいす、あずき、いんげんまめ、らつかせいを除く)			排草前又はは種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	50~100	2回以内	2回以内	3回以内
			取後5日前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前又は出芽前まで (雑草生育期)	500ml/10a	50~100	1回		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
あずき いんげんまめ		一年生雑草	取後5日前まで (雑草生育期)	500ml/10a	50~100	1回	4回以内	3回以内
			取後前又は出芽前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
だいす		一年生雑草	取後5日前まで (雑草生育期)	500ml/10a	50~100	1回	4回以内	3回以内
			取後前又は出芽前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
えだまめ		一年生雑草	取後5日前まで (雑草生育期)	500ml/10a	50~100	1回	4回以内	3回以内
			取後前又は出芽前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用法	1アールを含む農家の総使用回数
				葉量	希釈水量			
たまねぎ (葉播栽培)		一年生雑草	排草5日前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	50~100	3回以内	3回以内	3回以内
			排草前又はは種前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
たまねぎ (袋播栽培)		一年生雑草	排草5日前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	50~100	3回以内	3回以内	3回以内
			排草前又はは種前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後5日前まで (雑草生育期)	500ml/10a	50~100	1回		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
にんにく		一年生雑草	取後5日前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	50~100	1回	1回	3回以内
			取後前又はは種前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
ほうれんそう		一年生雑草	取後5日前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	50~100	1回	1回	3回以内
			取後前又はは種前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
にんにく		一年生雑草	取後5日前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	50~100	1回	1回	3回以内
			取後前又はは種前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
アスパラガス		一年生雑草	取後5日前まで (雑草生育期)	1500~2000ml/10a	50~100	1回	1回	3回以内
			取後前又はは種前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
だいこん		一年生雑草	取後5日前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	50~100	2回以内	2回以内	3回以内
			取後前又はは種前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
ピーマン		一年生雑草	取後5日前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	50~100	2回以内	2回以内	3回以内
			取後前又はは種前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
なす きゅうり		一年生雑草	取後5日前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	50~100	2回以内	2回以内	3回以内
			取後前又はは種前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
トマト		一年生雑草	取後5日前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	50~100	2回以内	2回以内	3回以内
			取後前又はは種前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
しゃくやく(薬用) たらぎ		一年生雑草	取後5日前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	50~100	2回以内	2回以内	3回以内
			取後前又はは種前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
薬用にんじん		一年生雑草	取後5日前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	50~100	2回以内	2回以内	3回以内
			取後前又はは種前まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		
			取後前日まで (雑草生育期)	少量散布 0.10a	25~50	2回以内		

作物	イモ (かん) 除く	かん	芥	牧	飼料用	飼料用	ソル
----	------------	----	---	---	-----	-----	----

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	薬剤の含まれる農薬の総使用回数
				葉量	希釈水量			
ホリマ (雑)		一年生雑草	播種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	1回	1回	3回以内	
		多年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期)	500~1000ml/10a	3回以内	3回以内		
		雑草	播種前まで (雑草生育期)	500~1500ml/10a	1回	1回		
ひわ (雑)		一年生雑草	播種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	1回	1回	3回以内	
		多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	500~1000ml/10a	3回以内	3回以内		
いも類 (かんしよを除く)		一年生雑草	播種前又は 播種前まで (雑草生育期)	500~1500ml/10a	1回	1回	2回以内	
		多年生雑草	収穫60日前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	2回以内	2回以内		
かんしよ		一年生及び 多年生雑草	播種前又は 播種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	2回以内	2回以内	2回以内	
		多年生雑草	収穫60日前まで (雑草生育期)	500~1000ml/10a	2回以内	2回以内		
茶		一年生雑草	播種前又は 播種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	4回以内	4回以内	3回以内	
		多年生雑草	収穫60日前まで (雑草生育期)	500~1000ml/10a	2回以内	2回以内		
さとうきび	園圃内の 周縁部	一年生雑草	播種前又は 播種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	2回以内	2回以内	6回以内	
		多年生雑草	収穫60日前まで (雑草生育期)	500~1000ml/10a	2回以内	2回以内		
牧草 草地 (更新・造成)		一年生及び 多年生雑草	播種前又は 播種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	3回以内	3回以内	3回以内	
		多年生雑草	収穫60日前まで (雑草生育期)	500~1000ml/10a	2回以内	2回以内		
飼料用とうもろこし		一年生雑草	播種前又は 播種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	4回以内	4回以内	2回以内	
		多年生雑草	収穫60日前まで (雑草生育期)	500~1000ml/10a	2回以内	2回以内		
飼料用さとうきび		一年生雑草	播種前又は 播種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	4回以内	4回以内	2回以内	
		多年生雑草	収穫60日前まで (雑草生育期)	500~1000ml/10a	2回以内	2回以内		
ソルガム		一年生雑草	播種前又は 播種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	2回以内	2回以内	2回以内	

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	薬剤の含まれる農薬の総使用回数
				葉量	希釈水量			
花菜類・根菜類 (きくを除く)		一年生雑草	播種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	2回以内	2回以内	2回以内	
		多年生雑草	播種前又は 播種前まで (雑草生育期)	500~1000ml/10a	4回以内	4回以内		
きく		一年生雑草	播種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	2回以内	2回以内	2回以内	
		多年生雑草	播種前又は 播種前まで (雑草生育期)	500~1000ml/10a	4回以内	4回以内		
樹木類		一年生雑草	播種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	2回以内	2回以内	4回以内	
		多年生雑草	播種前又は 播種前まで (雑草生育期)	500~1000ml/10a	4回以内	4回以内		
林木	茶地・遊茶地 (他ごしよを除く)	一年生雑草	播種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	2回以内	2回以内	3回以内	
		多年生雑草	播種前又は 播種前まで (雑草生育期)	500~1000ml/10a	4回以内	4回以内		
桑		一年生雑草	播種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	2回以内	2回以内	4回以内	
		多年生雑草	播種前又は 播種前まで (雑草生育期)	500~1000ml/10a	4回以内	4回以内		
樹木等	公園 堤とう 遊茶場 遊歩道 遊憩地 のり面 雑草等	一年生雑草	播種前まで (雑草生育期)	200~500ml/10a	2回以内	2回以内	3回以内	
		多年生雑草	播種前又は 播種前まで (雑草生育期)	500~1000ml/10a	4回以内	4回以内		

